



പ്രമേഹവും ആസ്വത്രി ജീവിതവും

മറ്റു രോഗങ്ങൾക്ക് ആസ്വത്രികളിൽ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗികളുടെ പ്രമേഹസംബന്ധമായ സങ്കീർണതകൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകും. ഇത് അപകടമാണ്. മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രമേഹവും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം.

ആധുനിക ചികിത്സാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന് നാം ധാരാളം സംവിധാനങ്ങൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സംവിധാനങ്ങൾ കയ്യെത്താവുന്ന ദൂരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ആസ്വത്രിയിൽ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗികൾക്കിടയിൽ പ്രമേഹ സംബന്ധമായ സങ്കീർണതകൾ സാധാരണയായി കണ്ടു വരുന്നു. ഇത് വൈരുദ്ധ്യമായി തോന്നാമെങ്കിലും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത വസ്തുതയാണ്.

സമൂഹത്തിൽ പ്രമേഹരോഗികൾ നാൾക്കു നാൾ കൂടി വരികയാണ്. 2025 ഓടെ നാലിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നാം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഈ വർദ്ധന കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും തെക്കെ ഇന്ത്യയിൽ.

പ്രമേഹത്തിന് ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടിക്കൊണ്ട് നടത്തിവരുന്ന ചികിത്സാ രീതി (Outpatient treatment) പരക്കെ അറിയപ്പെട്ടതും ആളുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ ആസ്വത്രികളിൽ മറ്റു രോഗങ്ങൾക്കായി കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗികളുടെ (Inpatient treatment) പ്രമേഹ സംബന്ധമായ സങ്കീർണതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പൊതുവെ ശ്രദ്ധ കുറവാണ്. ഹൃദയ സ്തംഭനം, തളർവാതം, കാലിൽ വ്രണം, വൃക്ക രോഗങ്ങൾ, പഴുപ്പ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം ആസ്വത്രിയിൽ കി

ടന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നു. എന്നാൽ ഈ രോഗങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണക്കാരൻ പലപ്പോഴും വർഷങ്ങളായി കൂടെയുള്ള പ്രമേഹമായിരിക്കും. ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് പ്രമേഹരോഗികൾ ആസ്വത്രിയിൽ എത്തുന്നത്. അല്ലാതെ പ്രമേഹ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കില്ല. പലവിധ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആസ്വത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട രോഗികളിൽ 13 മുതൽ 20% വരെ പ്രമേഹം കൂടി ഉള്ളവരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് ആസ്വത്രിയിലെ രോഗികളിൽ നല്ലൊരു ശ

തമാനത്തിന് പ്രമേഹ ചികിത്സ കൂടി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ആസ്വത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്ന രോഗികളുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ പലതാണ്.

- പ്രമേഹം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം അറിയാത്തത്.
- മറ്റു രോഗങ്ങൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്.
- പ്രമേഹ ബാധിതരാണെങ്കിലും, ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകാത്തത്.
- ആസ്വത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന മാനസിക സംഘർഷം.
- മറ്റു രോഗ ചികിത്സയ്ക്കായി സ്റ്റീറോയ്ഡ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകുന്നത്.

ആസ്വത്രിയിലെത്തുമ്പോൾ

ഒരു പ്രമേഹരോഗി ആസ്വത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് രോഗത്തിനായാലും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായാലും രോഗിയുടെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് തുടക്കം മുതലേ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് മൂലം ഒരു പ്രമേഹരോഗി മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് 3-4 ദിവസങ്ങൾ ആസ്വത്രിയിൽ കൂടുതൽ കിടക്കേണ്ടി വരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ പണച്ചെലവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് അനുപേക്ഷണീയമാണ്. രോഗികളുടെ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും, അണുബാ



ഡോ. ടി.കെ. സബീർ

ഡയാകെയർ, സെന്റർ ഫോർ ഡയബറ്റീസ് & എന്റോ ക്രൈനോളജി, കണ്ണൂർ

