



പാദം സംരക്ഷിക്കാം

പ്രമേഹരോഗികൾ പാദങ്ങളിൽ മുറിവുണ്ടാകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പാദരക്ഷകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം.

പാദങ്ങളിൽ മുറിവ്, വിള്ളലുകൾ, ചുട്, നീര്, നിറവിത്യാസം എന്നിവ കണ്ടാൽ ഉടൻ ഡോക്ടറെ കാണുക.

പ്രമേഹരോഗികളിൽ പാദത്തിൽ മുറിവുണ്ടാകുന്നത് അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ്. കാരണം അങ്ങനെ മുറിവുണ്ടാവുന്നവരിൽ നാലിൽ ഒരാളുടെ കാലു മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വരാം. 40 വയസിനു മുകളിലാണു പാദചേദത്തിന്റെ നിരക്കു കൂടുതലായി കാണുന്നത്.

പ്രമേഹസംബന്ധമായ എല്ലാ പാദരോഗങ്ങളും തടയാവുന്നതല്ലെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തിയാൽ ദുഷ്യവശങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും പാദങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും.

നാലുകാരണങ്ങൾ

പ്രമേഹരോഗികളിൽ പാദരോഗങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണുന്നതിനു പ്രധാനമായി നാലു കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.

●**ന്യൂറോപ്പതി:** പ്രമേഹരോഗിയിൽ ഞരമ്പുകൾക്കു കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അതു ന്യൂറോപ്പതി (ഞരമ്പുകളുടെ ശേഷിക്കുറവ്) എന്ന അവസ്ഥയിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരക്കാരുടെ പാദങ്ങൾക്കു ചുടോ, തണുപ്പോതിരിച്ചറിയാനാകാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു.

ഇതു കാരണം കാലിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മുറിവുകളോ, പരിക്കോ അറിയാൻ കഴിയാതെ വരും. മിക്കവാറും ഇത്തരം പരിക്കുകൾ കാൽ

മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാക്കാം.

●**രൂപഭേദങ്ങൾ:** ഞരമ്പുകളുടെ ശേഷിനാശം കാരണം ഇവരുടെ പാദങ്ങളിൽ സാധാരണമല്ലാത്ത മർദ്ദ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാവുകയും അവ മുറിവുകൾക്കു കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

സാധാരണയായി തടവുകൾ, കുരുക്കൾ, വിരലുകളുടെ രൂപഭേദം എന്നിയാണു ന്യൂറോപ്പതി കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രമേഹരോഗികളുടെ കാലുകളുടെ ചെറിയ രൂപഭേദം പോലും അവരുടെ കാലുകളിൽ വലിയ വ്രണങ്ങൾക്കു കാരണമാകും.

●**രക്തചംക്രമണക്കുറവ്:** പ്രമേഹത്തിന്റെ ഫലമായി രോഗികളിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തചംക്രമണം കുറയുന്നു. ഈ അവസ്ഥ കാലുകളിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാതിരിക്കാനും തുടർന്നു വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

രോഗിക്കു പുകവലിശീലം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതു കൂടുതൽ ഗുരുതരമായിരിക്കും.

●**അണുബാധ:** കുറഞ്ഞ രക്തചംക്രമണം, നാഡിശേഷിക്കുറവ് ഇവ കാലുകളിൽ അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രമേഹം തന്നെയും രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടിയാണ്. ഇതു കാരണം ചികിത്സ വിഷമം പിടിച്ചതും ദൈർഘ്യമേറിയതും ആയിത്തീരുന്നു.

